



ACIENDEL® PLUS



Acción.

Antiparasitario externo pour-on para bovinos, ovinos y caprinos. Sus características son: gran poder de volteo, persistencia de acción antiparasitaria y repelencia, lo que le otorga un alto poder residual.

Composición.

Cipermetrina, 5 g; clorpirifós, 2,5 g; butóxido de piperonilo (PBX), 1 g; excipientes, c.s.p. 100 mL.

Indicaciones.

Control y tratamiento de piojos chupadores (*Haematopinus eurysternus*; *Linognathus vituli*, *ovillus* y *pedalis*), piojos masticadores (*Bovicola bovis* y *Damalinia ovis*) y mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*), en bovinos, ovinos y caprinos. También está indicado para combatir otros insectos hematófagos perjudiciales (mosquitos, tábanos, mosca brava, etc.). **Piojos:** el tiempo necesario para la eliminación parasitaria es de 4 a 6 semanas. En ovinos adultos, los tratamientos deben realizarse dentro de los 45 días después de la esquila. Los corderos pueden tratarse en cualquier momento.

Dosis y vías de Administración.

Bovinos: 10 mL hasta 400 kg de p.v. y 20 mL para animales de más de 400 kg de p.v. Las dosis se pueden modificar según criterio profesional. **Ovinos y caprinos:** 1 mL cada 10 kg de p.v. Aplicar por derrame cutáneo dorsal (pour-on) con cánula lluvia desde el encuentro al anca y en los flancos.

Recomendaciones.

No aplicar con amenaza de lluvia. En caso de producirse lluvias dentro de las 24 hs. de la aplicación, repetir el tratamiento.

Periodo de retiro.

Entre el último tratamiento y la faena para consumo deben transcurrir 35 días. Entre el último tratamiento y el ordeño para consumo humano y/o industrialización de la leche deben transcurrir 12 hs.

Presentación.

Bidones dosificadores de 1 L. Bidones mochila de 2,5 L.



**Biogénesis
Bagó**